

05G007_CBDCA(1) + PTX200mg/m²(1) 3週毎CBDCA (Day 1) + PTX 200mg/m² (Day 1) 3週毎

◆ _____月_____日(Day1)から_____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

◆アルコールに対する過敏症はありませんか? → (有 , 無)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレビタントCap	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	po		●	●	●				
2 生食注 (100mL) デカドロン注射液1. 65mg ボラミン注5mg ガスター注射液20mg	1 瓶 10 A 1 A 1 A	div / 15min		●						
3 グラニセトロン点滴3mgバッグ	1 袋	div / 30min		●						
4 テルモ生食 (500mL) パクリタキセル注	1 袋 _____ mg [200mg/m ²]	div / 3hr		○						
5 生食注 (50mL)	1 瓶	div(フラッシュ) / 全開		●						
6 ブドウ糖注 5% (250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [AUC 6]	div / 1hr		○						
7 生食注 (50mL)	1 瓶	div(フラッシュ) / 全開		●						

パクリタキセル注投与時には、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。
また、点滴用セット等で溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。