

## 05G009\_CBDCA(1) + VP-16(1・2・3) 3週毎

CBDCA ( Day 1 ) + VP-16 ( Day 1・2・3 ) 3週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレピタントCap	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	po		●	●	●				
2 グラニセトロン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1.65mg	1 袋 3 A	div / 15min		●						
3 生食注 ( 100mL ) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 3 A	div / 15min			●	●				
4 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [ AUC 5 ]	div / 1hr		○						
5 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(フラッシュ) / 全開		●	●	●				
6 テルモ生食 ( 500mL ) ペプシド注	1 袋 _____ mg [ 100mg/m2 ]	div / 1.5hr		○	○	○				
7 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(フラッシュ) / 全開		●	●	●				

・ペプシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。