

## 05G022\_AVASTIN(1)+CBDCA(1)+PTX(1) 3週毎

Bevacizumab ( Day 1 ) + CBDCA ( Day 1 ) + PTX ( Day 1 ) 3週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(Day1)から\_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

◆アルコールに対する過敏症はありませんか? → ( 有 , 無 )

| Rp. 商品名  | 用量 [ 基準量 ]                               | 投与方法          | Day 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--|---------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 アプレビタントCap   | 125mg (Day1)<br>80mg (Day2-3)            | po            |       | ● | ● | ● |   |   |   |   |
| 2 生食注 ( 100mL )<br>デカドロン注射液1.65mg<br>ボラミン注5mg<br>ガスター注射液20mg | 1 瓶<br>10 A<br>1 A<br>1 A                | div / 15min   |       | ● |   |   |   |   |   |   |
| 3 グラニセトロン点滴3mgバッグ  | 1 袋                                      | div / 30min   |       | ● |   |   |   |   |   |   |
| 4 テルモ生食 ( 500mL )<br>パクリタキセル注                                | 1 袋<br>_____ mg [ 200mg/m <sup>2</sup> ] | div / 3hr     |       | ○ |   |   |   |   |   |   |
| 5 生食注 ( 50mL )   | 1 瓶                                      | div(フラッシュ)    |       | ● |   |   |   |   |   |   |
| 6 ブドウ糖注 5% ( 250mL )<br>カルボプラチン注                             | 1 袋<br>_____ mg [ AUC 6 ]                | div / 1hr     |       | ○ |   |   |   |   |   |   |
| 7 生食注 ( 50mL )   | 1 瓶                                      | div(フラッシュ)    |       | ● |   |   |   |   |   |   |
| 8 生食注 ( 100mL )<br>アバスチン点滴用                                  | 1 瓶<br>_____ mg [ 15mg/kg ]              | div / ※ 1.5hr |       | ○ |   |   |   |   |   |   |
| 9 生食注 ( 50mL )   | 1 瓶                                      | div(フラッシュ)    |       | ● |   |   |   |   |   |   |

※パクリタキセル注投与時には、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。

また、点滴用セット等で溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。

※アバスチン注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。

※術後補助化学療法として用いない事。