

05N001_CDDP(1) + VP-16(1・2・3) 3週毎

CDDP (Day 1) + VP-16 (Day 1・2・3) 3週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレピタントCap	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	po		●	●	●				
2 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div(メイン) / 3hr	●							
3 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div(メイン) / 3hr	●							
4 アロキシシ点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1. 65mg	1 袋 6 A	div(メイン) / 15min		●						
5 生食注 (100mL) デカドロン注射液1. 65mg	1 瓶 5 A	div(メイン) / 15min			●	●	●			
6 テルモ生食 (500mL)	1 袋	div(メイン) / 2hr		●						
7 テルモ生食 (500mL) エトポシド点滴静注液	1 袋 _____ mg [100mg/m ²]	div(メイン) / 2hr		○	○	○				
8 テルモ生食 (500mL)	1 袋	div(メイン) / 2hr		●						
9 生食注 (1リットル) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [80mg/m ²]	div(メイン) / 4hr		○						
10 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div(メイン) / 2hr		●	●	●				
11 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div(メイン) / 翌朝まで		●						
12 20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div(側管) / 6hr		●						
13 フロセミド注射液20mg	1 A	iv								

※マンニトール点滴中の3時間尿が300mL以下の時に投与

・エトポシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。