

05N004_CDDP(1) + DTX(1) 3-4週毎

CDDP (Day 1) + DTX (Day 1) 3-4週毎 4コース

◆ _____月_____日(Day1)から_____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

| Rp. 商品名 | 用量 [基準量] | 投与方法 | Day 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 アプレピタントCap | 125mg (Day1) 80mg (Day2-3) | po | | ● | ● | ● | | | | |
| 2 デカドロン錠 0.5mg | 16 Tab | po | | | ● | ● | ● | | | |
| 3 ソルデム3A (500mL) | 1 袋 | div(メイン) / 3hr | ● | | | | | | | |
| 4 ソルデム3A (500mL) | 1 袋 | div(メイン) / 3hr | ● | | | | | | | |
| 5 アロキシ点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1.65mg | 1 袋 6 A | div(メイン) / 15min | | ● | | | | | | |
| 6 テルモ生食 (500mL) | 1 袋 | div(メイン) / 2hr | | ● | | | | | | |
| 7 ブドウ糖注 5% (250mL) ドセタキセル点滴静注 | 1 袋 _____ mg [60mg/m2] | div(メイン) / 1hr | | ○ | | | | | | |
| 8 テルモ生食 (500mL) | 1 袋 | div(メイン) / 2hr | | ● | | | | | | |
| 9 生食注 (1リットル) シスプラチン注 | 1 袋 _____ mg [80mg/m2] | div(メイン) / 4hr | | ○ | | | | | | |
| 10 ソルデム3A (500mL) | 1 袋 | div(メイン) / 2hr | | ● | ● | ● | | | | |
| 11 ソルデム3A (500mL) | 1 袋 | div(メイン) / 2hr | | ● | ● | ● | | | | |
| 12 ソルデム3A (500mL) | 1 袋 | div(メイン) / 翌朝まで | | ● | | | | | | |
| 13 20%マンニトール注(300mL) | 1 袋 | div(側管) / 6hr | | ● | | | | | | |
| 14 フロセミド注射液20mg | 1 A | iv | | | | | | | | |

※マンニトール点滴中の3時間尿が300mL以下の時に投与