

05N008_CDDP(1) + Alimta(1) 3週毎

CDDP (Day 1) + Pemetrexed (Day 1) 3週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____ コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレピタントCap	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	po		●	●	●				
2 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po			●	●	●			
3 フレスミンS注射液1000 μ g	1 A	im								
										● Day -6 より9週毎に投与。
4 調剤用パンピタン末	1g	po / 分1								
										● Day -6 より連日投与。
5 生食注 (50mL) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 5 A	div / 30min	●							
6 生食注 (1リットル)	1 袋	div / 4hr	●	●						
7 アロキシ点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div / 15min		●						
8 生食注 アリムタ注射用	※ _____ mg [500mg/m ²] (全量 100mL とする。)	div / 10min		○						
9 生食注 (50mL)	1 瓶	div / 30min		●						
10 テルモ生食 (500mL) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [75mg/m ²]	div / 2hr		○						
11 生食注 (1リットル)	1 袋	div / 4hr		●	●	●				
12 生食注 (1リットル)	1 袋	div / 翌朝まで		●						

- ・NSAIDsは5日間中止を考慮。(Day -1 ~ 3)
- ・大量胸水、腹水貯留例は排除後に投与すること。