

05N009_CBDCA(1) + Alimta(1) 3週毎

CBDCA (Day 1) + Pemetrexed (Day 1) 3週毎

◆ _____月_____日(Day1)から_____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 フレスミンS注射液1000 μ g	1 A	im								
● Day -6 より9週毎に投与。										
2 調剤用バンピタン末	1g	po / 分1								
● Day -6 より連日投与。										
3 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po / 分2	●	●	●					
4 アプレピタントCap	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	po		●	●	●				
5 グラニセトロン点滴3mgバッグ	1 袋	div / 15min		●						
6 生食注 アリムタ注射用	※ _____mg [500mg/m ²] (全量 100mL とする。)	div / 10min		○						
7 生食注 (50mL)	1 瓶	div / 30min		●						
8 ブドウ糖注 5% (250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____mg [AUC 5]	div / 1hr		○						
9 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						

- ・NSAIDsは5日間中止を考慮。(Day -1 ~ 3)
- ・大量胸水, 腹水貯留例は排除後に投与すること。