

## 05N010\_AVASTIN(1) + Alimta(1) 3週毎

Bevacizumab ( Day 1 ) + Pemetrexed ( Day 1 ) 3週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_ コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 フレスミンS注射液1000 $\mu$ g	1 A	im								
● Day -6 より9週毎に投与。										
2 調剤用バンピタン末	1g	po / 分1								
● Day -6 より連日投与。										
3 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po	●	●	●					
4 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
5 生食注 アリムタ注射用	※ _____ mg [ 500mg/m <sup>2</sup> ] ( 全量 100mL とする。 )	div / 10min		○						
6 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
7 生食注 ( 100mL ) アバスチン点滴用	1 瓶 _____ mg [ 15mg/kg ]	div / ※ 1.5hr		○						
8 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						

※アバスチン注は忍容性良好であれば、初回 (1.5hr) , 2回目 (1hr) , 3回目以降 (30min) で投与可。

• NSAIDsは5日間中止を考慮。( Day -1 ~ 3 )

• 大量胸水, 腹水貯留例は排除後に投与すること。