

## 05N011\_AVASTIN(1)+CDDP(1)+Alimta(1) 3週毎

Bevacizumab ( Day 1 ) + CDDP ( Day 1 ) + Pemetrexed ( Day 1 ) 3週毎 4コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(Day1)から\_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

| Rp. 商品名                              | 用量 [ 基準量 ]  | 投与方法          | Day 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7                  |
|--------------------------------------|---|---------------|-------|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| 1 アプレピタントCap                         | 125mg (Day1)<br>80mg (Day2-3)                               | po            |       | ● | ● | ● |   |   |   |                    |
| 2 フレスミンS注射液1000 $\mu$ g              | 1 A   | im            |       |   |   |   |   |   |   |                    |
|                                      |   |               |       |   |   |   |   |   |   | ● Day -6 より9週毎に投与。 |
| 3 調剤用バンピタン末                          | 1g  | po / 分1       |       |   |   |   |   |   |   |                    |
|                                      |   |               |       |   |   |   |   |   |   | ● Day -6 より連日投与。   |
| 4 デカドロン錠 0.5mg                       | 16 Tab  | po            |       |   | ● | ● | ● |   |   |                    |
| 5 生食注 ( 100mL )<br>デカドロン注射液1.65mg    | 1 瓶<br>5 A  | div / 30min   | ●     |   |   |   |   |   |   |                    |
| 6 生食注 ( 1リットル )                      | 1 袋   | div / 4hr     | ●     | ● | ● | ● |   |   |   |                    |
| 7 アロキシ点滴注バッグ0.75mg<br>デカドロン注射液1.65mg | 1 袋<br>6 A  | div / 15min   |       | ● |   |   |   |   |   |                    |
| 8 生食注<br>アリムタ注射用                     | ※<br>_____ mg [ 500mg/m <sup>2</sup> ]<br>( 全量 100mL とする。 ) | div / 10min   |       | ○ |   |   |   |   |   |                    |
| 9 生食注 ( 50mL )                       | 1 瓶   | div / 30min   |       | ● |   |   |   |   |   |                    |
| 10 テルモ生食 ( 500mL )<br>シスプラチン注        | 1 袋<br>_____ mg [ 75mg/m <sup>2</sup> ]                     | div / 2hr     |       | ○ |   |   |   |   |   |                    |
| 11 生食注 ( 50mL )                      | 1 瓶   | div / フラッシュ   |       | ● |   |   |   |   |   |                    |
| 12 生食注 ( 100mL )<br>アバスチン点滴用         | 1 瓶<br>_____ mg [ 7.5mg/kg ]                                | div / ※ 1.5hr |       | ○ |   |   |   |   |   |                    |
| 13 生食注 ( 1リットル )                     | 1 袋   | div / 4hr     |       | ● |   |   |   |   |   |                    |
| 14 生食注 ( 1リットル )                     | 1 袋   | div / 翌朝まで    |       | ● |   |   |   |   |   |                    |

※アバスチン注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr), 2回目(1hr), 3回目以降(30min)で投与可。

・NSAIDsは5日間中止を考慮。( Day -1 ~ 3 )

・大量胸水, 腹水貯留例は排除後に投与すること。