

05N013_Short CDDP(1) + VP-16(1・2・3) 3週毎

CDDP (Day 1) + VP-16 (Day 1・2・3) 3週毎 6コース

◆ _____月_____日(Day1)から_____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレピタントCap	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	po		●	●	●				
2 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po			●	●	●			
3 アロキシシ点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div / 15min		●						
4 生食注 (50mL)	1 瓶	div / 15min			●	●				
5 テルモ生食 (500mL) ペプシド注	1 袋 _____ mg [100mg/m2]	div / 1.5hr		○	○	○				
6 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
7 YDソリター-T1号 (500mL) KCL注20mEqキット 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1 袋 10mEq 8mEq	div / 1hr		●						
8 20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div / 30min		●						
9 生食注 (250mL) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [80mg/m2]	div / 1hr		○						
10 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div / 1hr		●						
11 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ			●	●				

- ・ペプシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。
- ・Day1～3:水分摂取1L。(1日目はシスプラチンの投与が終了するまでに水分1Lを摂取すること。)
- ・脱水、食思不振時は追加補液。