

## 05N015\_Short CDDP(1) + GEM(1・8) 3週毎

CDDP ( Day 1 ) + GEM ( Day 1・8 ) 3週毎 6コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(Day1)から\_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレピタントCap	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	po		●	●	●				
2 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po			●	●	●			
3 アロキシ点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div / 15min		●						
4 生食注 ( 100mL ) デカドロン注射液1.65mg	1 瓶 4 A	div / 15min								● Day 8
5 生食注 ( 100mL ) ゲムシタピン注	1 瓶 _____ mg [ 1000mg/m2 ]	div / 30min		○						○ Day 8
6 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
7 YDソリター-T1号 (500mL) KCL注20mEqキット 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1 袋 10mEq 8mEq	div / 1hr		●						
8 20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div / 30min		●						
9 生食注 ( 250mL ) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [ 80mg/m2 ]	div / 1hr		○						
10 ソルデム3A ( 500mL )	1 袋	div / 1hr		●						
11 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ								● Day 8

- ・Day1～3:水分摂取1L。(1日目はシスプラチンの投与が終了するまでに水分1Lを摂取すること。)
- ・脱水、食思不振時は追加補液。