

## 05N016\_Short CDDP(1) + DTX(1) 3週毎

CDDP ( Day 1 ) + DTX ( Day 1 ) 3週毎 6コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_ コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレピタントCap	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	po		●	●	●				
2 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po			●	●	●			
3 アロキシ点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div / 15min		●						
4 ブドウ糖注 5% (250mL) ドセタキセル点滴静注	1 袋 _____ mg [ 60mg/m <sup>2</sup> ]	div / 1hr		○						
5 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
6 YDソリターT1号 (500mL) KCL注20mEqキット 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1 袋 10mEq 8mEq	div / 1hr		●						
7 20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div / 30min		●						
8 生食注 (250mL) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [ 80mg/m <sup>2</sup> ]	div / 1hr		○						
9 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div / 1hr		●						

- Day1～3:水分摂取1L。(1日目はシスプラチンの投与が終了するまでに水分1Lを摂取すること。)
- 脱水、食思不振時は追加補液。