

## 05N017\_Short CDDP(1) + Alimta(1) 3週毎

CDDP ( Day 1 ) + Pemetrexed ( Day 1 ) 3週毎 6コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレピタントCap	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	po		●	●	●				
2 フレスミンS注射液1000 μg	1 A	im								
										● Day -6 より9週毎に投与。
3 調剤用バンピタン末	1g	po / 分1								
										● Day -6 より連日投与。
4 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po	●	●	●	●	●			
5 アロキシ点滴注バッグ0.75mg	1 袋	div / 15min		●						
6 生食注 アリムタ注射用	※ _____ mg [ 500mg/m <sup>2</sup> ] ( 全量 100mL とする。 )	div / 10min		○						
7 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
8 YDソリターT1号 (500mL) KCL注20mEqキット 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1 袋 10mEq 8mEq	div / 1hr		●						
9 20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div / 30min		●						
10 生食注 ( 250mL ) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [ 75mg/m <sup>2</sup> ]	div / 1hr		○						
11 ソルデム3A ( 500mL )	1 袋	div / 1hr		●						

- ・NSAIDsは5日間中止を考慮。( Day -1 ~ 3 )
- ・大量胸水、腹水貯留例は排除後に投与すること。
- ・Day1~3:水分摂取1L。(1日目はシスプラチンの投与が終了するまでに水分1Lを摂取すること。)
- ・脱水、食思不振時は追加補液。