

## 05N022\_KEY(1)+ShortCDDP(1)+Alimta(1) 3週毎

Pembrolizumab ( Day 1 ) + CDDP ( Day 1 ) + Pemetrexed ( Day 1 ) 3週毎 4コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(Day1)から\_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

◆ 免疫チェックポイント阻害薬カンファレンス前検査はすべて実施しましたか? → ( はい ・ いいえ )

◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

Rp.	商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1	アプレピタントCap	125mg(Day1) 80mg(Day2-3)	po / 分1		●	●	●				
2	フレズミンS注射液1000 $\mu$ g	1 A	im								● Day -6 より9週毎に投与。
3	調剤用バンピタン末	1g	po / 分1								● Day -6 より連日投与。
4	デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po / 分2	●	●	●	●	●			
5	生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / 15min		●						
6	生食注 ( 100mL ) キイトルーダ点滴静注	1 瓶 200 mg [ 200mg/body ]	div / 30min		○						
7	生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / 15min		●						
8	アロキシ点滴注バッグ0.75mg	1 袋	div / 15min		●						
9	生食注 アリムタ注射用	※ _____ mg [ 500mg/m <sup>2</sup> ] ( 全量 100mL とする。 )	div / 10min		○						
10	生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
11	YDソリター-T1号 (500mL) アスパラギン酸カルシウム注10mEqキット 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1 袋 1 キット 8mEq	div / 1hr		●						
12	20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div / 30min		●						
13	生食注 ( 250mL ) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [ 75mg/m <sup>2</sup> ]	div / 1hr		○						
14	ソルデム3A ( 500mL )	1 袋	div / 1hr		●						

- ・ キイトルーダ注の投与にあたっては、インラインフィルター(0.2~0.22 $\mu$ m)を使用すること。
- ・ キイトルーダ注の希釈後濃度は、1~10mg/mLとなること。
- ・ NSAIDsは5日間中止を考慮。( Day -1 ~ 3 )
- ・ 大量胸水、腹水貯留例は排除後に投与すること。
- ・ Day1~3: 水分摂取1L。(1日目はシスプラチンの投与が終了するまでに水分1Lを摂取すること。)
- ・ 脱水、食思不振時は追加補液。