

## 06N002\_胆道\_GC [ CDDP(1・8) + GEM(1・8) 3週毎 ]

CDDP ( Day 1・8 ) + GEM ( Day 1・8 ) 3週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレピタントCap	125mg (Day1, 8) 80mg (Day2-3, 9-10)	po		●	●	●				
					● Day 8-10					
2 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po			●	●	●			
					● Day 9-11					
11 生食注 ( 1リットル )	1 袋	div(メイン) / 3hr		●						
						● Day 8				
12 アロキシ点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div(側管) / 15min		●						
						● Day 8				
13 生食注 シスプラチン注	※ _____ mg [ 25mg/m <sup>2</sup> ] ( 全量 250mL とする。 )	div(側管) / 1hr		○						
						○ Day 8				
14 生食注 ( 250mL )	1 袋	div(側管) / 45min		●						
						● Day 8				
15 生食注 ( 100mL ) ゲムシタピン注	1 瓶 _____ mg [ 1000mg/m <sup>2</sup> ]	div(側管) / 30min		○						
						○ Day 8				
16 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(側管) / フラッシュ		●						
						● Day 8				
17 生食注 ( 50mL ) フロセミド注射液20mg	1 瓶 1 A	div(側管) / 10min		●						
						● Day 8				
18 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(側管) / フラッシュ		●						
						● Day 8				

・必要時に応じてHydration量を追加すること。