

06N003_Cyramza(1・15) + PTX(1・8・15) 4週毎

Ramucirumab (Day 1・15) + PTX (Day 1・8・15) 4週毎

◆ _____月_____日(Day1)から_____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

◆アルコールに対する過敏症はありませんか? → (有 , 無)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 (100mL) デカドロン注射液1. 65mg ボラミン注5mg ガスター注射液20mg	1 瓶 5 A ※1 1 A 1 A	div / 15min		●						
						● Day 8 / ● Day 15				
2 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
						----- / ● Day 15				
3 生食注 (250mL) サイラムザ点滴静注液	1 袋 _____ mg [8mg/kg] (全量 250mL とする。)	div / 1hr		○						
						----- / ○ Day 15				
4 生食注 (50mL)	1 瓶	div / 1hr ※2		●						
						----- / ● Day 15				
5 生食注 (50mL)	1 瓶	div / 30min								
						● Day 8 / -----				
6 生食注 (250mL) パクリタキセル注	1 袋 _____ mg [80mg/m2]	div / 1hr		○						
						○ Day 8 / ○ Day 15				
7 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
						● Day 8 / ● Day 15				

※1 デカドロン注は医師の判断にて減量。(最低1Aは必要。)

※2 サイラムザ注の忍容性良好であれば、Rp.4の生食注は3サイクル目以降、30minで投与可。

投与時は、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。
また、点滴用セット等で溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。