

## 06N004\_食道\_PTX(1・8・15・22・29・36) 7週毎

PTX ( Day 1・8・15・22・29・36 ) 7週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_ コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

◆ アルコールに対する過敏症はありませんか? → ( 有 , 無 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 ( 100mL ) デカドロン注射液1. 65mg ボラミン注5mg ガスター注射液20mg	1 瓶 5 A ( 初回 ) 1 A 1 A	div / 15min		●						
								● Day 8   Day 15   Day 22   Day 29   Day 36		
2 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / 30min		●						
								● Day 8   Day 15   Day 22   Day 29   Day 36		
3 生食注 ( 250mL ) パクリタキセル注	1 袋 _____ mg [ 100mg/m2 ]	div / 1hr		○						
								○ Day 8   Day 15   Day 22   Day 29   Day 36		
4 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
								● Day 8   Day 15   Day 22   Day 29   Day 36		

パクリタキセル注投与時には、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。  
また、点滴用セット等で溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。

デカドロン注射液は医師の判断にて減量。(最低1Aは必要。)