

## 06N008\_(4週毎)IRIS + Bev

Bevacizumab (Day 1) + CPT-11 (Day 1) + S-1 (Day 1-14) 4週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(Day1)から\_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
								● Day 15		
2 生食注 ( 100mL ) アバスチン点滴用	1 瓶 _____ mg [ 5mg/kg ]	div / ※ 1.5hr		○						
								○ Day 15		
3 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
								● Day 15		
4 グラニセトロン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div / 15min		●						
								● Day 15		
5 テルモ生食 ( 500mL ) イリノテカン塩酸塩注	1 袋 _____ mg [ 100mg/m <sup>2</sup> ]	div / 1.5hr		○						
								○ Day 15		
6 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
								● Day 15		
101 エスワンタイホウ配合OD錠	_____ mg [ 80-120mg/body/日 ]	po / 分2								
									● Day 1-14	

※アバスチン注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。