

## 10G007\_胃\_PTX(1・8) + S-1(1-14) 3週毎

PTX ( Day 1・8 ) + S-1 ( Day 1-14 ) 3週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_ コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

◆ アルコールに対する過敏症はありませんか？ → ( 有 , 無 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 ( 100mL ) デカドロン注射液 1.65mg ガスター注射液 20mg ボララミン注 5mg	1 瓶 5 A ( 初回 ) 1 A 1 A	div / 15min		●					● Day 8	
2 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / 30min		●					● Day 8	
3 生食注 ( 250mL ) パクリタキセル注	1 袋 _____ mg [ 50mg/m <sup>2</sup> ]	div / 1hr		○					○ Day 8	
4 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(フラッシュ) / 全開		●					● Day 8	
101 エスワンタイホウ配合OD錠	_____ mg [ 80mg/m <sup>2</sup> /day ]	po								● Day 1-14

パクリタキセル注投与時には、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。  
また、点滴用セット等で溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。

デカドロン注射液は医師の判断にて減量。(最低1Aは必要。)