

10G030_大腸_AVASTIN + mFOLFOX 6 (リザーバー)

Bevacizumab (Day 1) + I-LV (Day 1) + FU (Day 1) + L-OHP (Day 1) 2週毎

◆ _____月_____日(Day1)から_____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 ヘパリンNaロック100u/mLシリンジ	1 筒	導通確認		●						
2 生食注 (50mL)	1 瓶	メイン / (フラッシュ)		●						
3 生食注 (100mL) アバスチン点滴用	1 瓶 _____ mg [5mg/kg]	メイン / ※ 1.5hr		○						
4 生食注 (50mL)	1 瓶	メイン / (フラッシュ)		●						
5 グラニセトロン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	メイン / 30min		●						
6 ブドウ糖注 5% (250mL) レボホリナート注	1 袋 _____ mg [I-LV 200mg/m2]	メイン / 2hr L-OHPと同時		●						
7 ブドウ糖注 5% (250mL) オキサリプラチン点滴静注液	1 袋 _____ mg [85mg/m2]	側管 / 2hr I-LVと同時		○						
8 生食注 (50mL) 5-FU注	1 瓶 _____ mg [400mg/m2]	メイン / 全開		○						
9 生食注 5-FU注	※ _____ mg [2400-3000mg/m2]	メイン / 46hr		○						
10 ヘパリンNaロック100u/mLシリンジ	1 筒	ヘパロック							●	

※アバスチン注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。

※5-FU注のリザーバー全量は薬剤部規定の希釈表に従うものとする。〈 注入時間:約46時間 〉