

10G051_臍_GEM(1・8・15)+TARCEVA 4週毎

GEM (Day 1・8・15) + Erlotinib (Day 1-28) 4週毎

◆ _____月_____日(Day1)から_____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

| Rp. 商品名 | 用量 [基準量] | 投与方法 | Day 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|---|------------------|---|---|------------|---|---|
| 1 生食注 (100mL) デカドロン注射液1. 65mg | 1 瓶 4 A | div / 15min | | ● | | | | | | |
| | | | | | ● Day 8 / Day 15 | | | | | |
| 2 生食注 (100mL) ゲムシタピン注 | 1 瓶 _____ mg [1000mg/m2] | div / 30min | | ○ | | | | | | |
| | | | | | ○ Day 8 / Day 15 | | | | | |
| 3 生食注 (50mL) | 1 瓶 | div / フラッシュ | | ● | | | | | | |
| | | | | | ● Day 8 / Day 15 | | | | | |
| 101 タルセパ錠 | _____ mg [100mg/body] | po / 眠前 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ● Day 1-28 | | |

※ 皮膚障害対策として、あらかじめ”RASH対応セット”をオーダーしてください。