

10G057_臍_GEM + nab-PTX療法

GEM (Day 1・8・15) + nab-PTX (Day 1・8・15) 4週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____ コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アロキシン点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 4 A	div / 15min		●						
					● Day 8 / Day 15					
2 生食注 (50mL)	1 瓶	div(フラッシュ)		●						
					● Day 8 / Day 15					
3 生食注 (50mL) アブラキサン注	1 瓶 _____ mg [125mg/m ²]	div / 30min		○						
					○ Day 8 / Day 15					
4 生食注 (50mL)	1 瓶	div(フラッシュ)		●						
					● Day 8 / Day 15					
5 生食注 (100mL) ゲムシタピン注	1 瓶 _____ mg [1000mg/m ²]	div / 30min		○						
					○ Day 8 / Day 15					
6 生食注 (50mL)	1 瓶	div(フラッシュ)		●						
					● Day 8 / Day 15					

※ 特定生物由来製品 (アブラキサン) 説明書を発行して、患者へ説明すること。