

## 10N005\_大腸\_mFOLFOX 6 ( 末梢 )

I-LV ( Day 1 ) + FU ( Day 1・2 ) + L-OHP ( Day 1 ) 2週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 グラニセトロン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div(メイン) / 30min		●						
2 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) レボホリナート注	1 袋 _____ mg [ I-LV 200mg/m2 ]	div(メイン) / 2hr L-OHPと同時		●						
3 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) オキサリプラチン点滴静注液	1 袋 _____ mg [ 85mg/m2 ]	div(側管) / 2hr I-LVと同時		○						
4 生食注 ( 50mL ) 5-FU注	1 瓶 _____ mg [ 400mg/m2 ]	div(メイン) / 全開		○						
5 ハルトマン液PH:8 ( 1リットル ) 5-FU注	1 袋 _____ mg [ 1200-1500mg/m2 ]	div(メイン) / 23hr		○	○					
6 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(メイン) / (フラッシュ)					●			