

10N006_大腸_AVASTIN + mFOLFOX 6 (末梢)

Bevacizumab (Day 1) + I-LV (Day 1) + FU (Day 1・2) + L-OHP (Day 1) 2週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____ コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 (100mL) アバスタチン点滴用	1 瓶 _____ mg [5mg/kg]	div(メイン) / ※ 1.5hr		○						
2 生食注 (50mL)	1 瓶	div(メイン) / (フラッシュ)		●						
3 グラニセトロン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div(メイン) / 30min		●						
4 ブドウ糖注 5% (250mL) レボホリナート注	1 袋 _____ mg [I-LV 200mg/m2]	div(メイン) / 2hr L-OHPと同時		●						
5 ブドウ糖注 5% (250mL) オキサリプラチン点滴静注液	1 袋 _____ mg [85mg/m2]	div(側管) / 2hr I-LVと同時		○						
6 生食注 (50mL) 5-FU注	1 瓶 _____ mg [400mg/m2]	div(メイン) / 全開		○						
7 ハルトマン液PH:8 (1リットル) 5-FU注	1 袋 _____ mg [1200-1500mg/m2]	div(メイン) / 23hr		○	○					
8 生食注 (50mL)	1 瓶	div(メイン) / (フラッシュ)							●	

※ アバスタチン注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。