

20N004_BEP

BLM (Day 2・9・16) + VP-16 (Day 1-5) + CDDP (Day 1-5) 3週毎 2~4コース

◆ _____月_____日(Day1)から_____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

★(注意喚起)累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
0 アプレビタントCap	125mg(Day1) 80mg(Day2-5)	po		●	●	●	●	●		
1 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div(メイン) / 6hr		●	●	●	●	●		
2 YDソリター-T1号 (500mL)	1 袋	div(メイン) / 6hr		●	●	●	●	●		
3 YDソリター-T1号 (500mL)	1 袋	div(メイン) / 6hr		●	●	●	●	●		
4 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div(メイン) / 6hr		●	●	●	●	●		
5 アロキシ点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1. 65mg	1 袋 6 A	div(側管) / 30min		●						●
6 生食注 (100mL) デカドロン注射液1. 65mg	1 瓶 5 A	div(側管) / 20min			●					
7 生食注 (100mL) デカドロン注射液1. 65mg	1 瓶 5 A	div(側管) / 30min				●	●			
8 テルモ生食 (500mL) エトポシド点滴静注液	1 袋 _____ mg [100mg/m2]	div(側管) / 2hr		○	○	○	○	○		
9 生食注 (50mL) フロセミド注射液20mg	1 瓶 1 A	div(側管) / フラッシュ		●	●	●	●	●		
10 テルモ生食 (500mL) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [20mg/m2]	div(側管) / 2hr		○	○	○	○	○		
11 20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div(側管) / 1hr		●	●	●	●	●		
12 生食注 (100mL)	1 瓶	div(メイン) / 1hr								● Day 9 / Day 16
13 生食注 (50mL) ソル・メドロール静注用125mg	1 瓶 1 瓶	div(側管) / フラッシュ								● Day 9 / Day 16
14 生食注 (50mL) プレオ注射用	1 瓶 30 mg [30mg/body]	div(側管) / 5min				○				○ Day 9 / Day 16
15 生食注 (50mL)	1 瓶	div(側管) / フラッシュ						●		

・エトポシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。