

## 23N002\_TC

CBDCA ( Day 1 ) + PTX 175-180mg/m<sup>2</sup> ( Day 1 ) 3週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(Day1)から\_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

◆アルコールに対する過敏症はありませんか? → ( 有 , 無 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレビタントCap	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	po		●	●	●				
2 生食注 ( 100mL ) デカドロン注射液1.65mg ボラミン注5mg ガスター注射液20mg	1 瓶 10 A 1 A 1 A	div / 15min		●						
3 グラニセトロン点滴3mgバッグ	1 袋	div / 30min		●						
4 テルモ生食 ( 500mL ) パクリタキセル注	1 袋 _____ mg [ 175-180mg/m <sup>2</sup> ]	div / 3hr		○						
5 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(フラッシュ)		●						
6 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [ AUC 5-6 ]	div / 1hr		○						
7 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(フラッシュ)		●						

パクリタキセル注投与時には、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。  
また、点滴用セット等で溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。