

## 23N011\_dose-dense TC

CBDCA ( Day 1 ) + PTX 80mg/m<sup>2</sup> ( Day 1・8・15 ) 3週毎 2-6コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_ コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

◆ アルコールに対する過敏症はありませんか？ → ( 有 , 無 )

| Rp. 商品名   | 用量 [ 基準量 ]                              | 投与方法        | Day 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                | 6 | 7 |
|---|---|-------------|-------|---|---|---|---|------------------|---|---|
| 1 アプレビタントCap  | 125mg (Day1)<br>80mg (Day2-3)           | po          |       | ● | ● | ● |   |                  |   |   |
| 2 生食注 ( 100mL )<br>デカドロン注射液1.65mg<br>ボララミン注5mg<br>ガスター注射液20mg | 1 瓶<br>5 A ( 初回 )<br>1 A<br>1 A         | div / 15min |       | ● |   |   |   | ● Day 8 / Day 15 |   |   |
| 3 グラニセトロン点滴3mgバッグ   | 1 袋                                     | div / 30min |       | ● |   |   |   |                  |   |   |
| 4 生食注 ( 50mL )  | 1 瓶                                     | div / 30min |       |   |   |   |   | ● Day 8 / Day 15 |   |   |
| 5 生食注 ( 250mL )<br>パクリタキセル注                                   | 1 袋<br>_____ mg [ 80mg/m <sup>2</sup> ] | div / 1hr   |       | ○ |   |   |   | ○ Day 8 / Day 15 |   |   |
| 6 生食注 ( 50mL )  | 1 瓶                                     | div / フラッシュ |       | ● |   |   |   |                  |   |   |
| 7 ブドウ糖注 5% ( 250mL )<br>カルボプラチン注                              | 1 袋<br>_____ mg [ AUC 5-6 ]             | div / 1hr   |       | ○ |   |   |   |                  |   |   |
| 8 生食注 ( 50mL )  | 1 瓶                                     | div / フラッシュ |       | ● |   |   |   | ● Day 8 / Day 15 |   |   |

パクリタキセル注投与時には、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。  
また、点滴用セット等で溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。

デカドロン注射液は医師の判断にて減量。(最低1Aは必要。)