

## 23N012\_CBDCA(1) + GEM(1・8) 3週毎

CBDCA ( Day 1 ) + GEM ( Day 1・8 ) 3週毎 6コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_ コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

| Rp. 商品名                              | 用量 [ 基準量 ]                                | 投与方法        | Day 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
|--------------------------------------|---|-------------|-------|---|---|---|---|---|---|---------|
| 1 アプレピタントCap                         | 125mg (Day1)<br>80mg (Day2-3)             | po          |       | ● | ● | ● |   |   |   |         |
| 2 グラニセトロン点滴3mgバッグ<br>デカドロン注射液1. 65mg | 1 袋<br>3 A                                | div / 15min |       | ● |   |   |   |   |   |         |
| 3 生食注 ( 100mL )<br>デカドロン注射液1. 65mg   | 1 瓶<br>4 A                                | div / 15min |       |   |   |   |   |   |   | ● Day 8 |
| 4 生食注 ( 100mL )<br>ゲムシタピン注           | 1 瓶<br>_____ mg [ 1000mg/m <sup>2</sup> ] | div / 30min |       | ○ |   |   |   |   |   | ○ Day 8 |
| 5 生食注 ( 50mL )                       | 1 瓶                                       | div / フラッシュ |       | ● |   |   |   |   |   |         |
| 6 ブドウ糖注 5% ( 250mL )<br>カルボプラチン注     | 1 袋<br>_____ mg [ AUC 4 ]                 | div / 1hr   |       | ○ |   |   |   |   |   |         |
| 7 生食注 ( 50mL )                       | 1 瓶                                       | div / フラッシュ |       | ● |   |   |   |   |   | ● Day 8 |