

23N014_卵巣_TC + AVASTIN

CBDCA (Day 1) + PTX 175-180mg/m² (Day 1) + Bevacizumab (Day 1) 3週毎 6コース

◆ _____月_____日(Day1)から_____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

◆ アルコールに対する過敏症はありませんか? → (有 , 無)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレビタントCap	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	po		●	●	●				
2 生食注 (100mL) デカドロン注射液1.65mg ボララミン注5mg ガスター注射液20mg	1 瓶 10 A 1 A 1 A	div / 15min		●						
3 グラニセトロン点滴3mgバッグ	1 袋	div / 30min		●						
4 テルモ生食 (500mL) パクリタキセル注	1 袋 _____ mg [175-180mg/m ²]	div / 3hr		○						
5 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
6 ブドウ糖注 5% (250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [AUC 5-6]	div / 1hr		○						
7 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
8 生食注 (100mL) アバスチン点滴用	1 瓶 _____ mg [15mg/kg]	div / ※ 1.5hr		○						
9 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						

※ アバスチン注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。

- ・ パクリタキセル注投与時には、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。また、点滴用セット等で溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。