

## 23N016\_DOXIL(1) + AVASTIN(1) 3or4週毎

DXR ( Day 1 ) + Bevacizumab ( Day 1 ) 3or4週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(Day1)から\_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

★(注意喚起)累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 ( 100mL ) デカドロン注射液1. 65mg	1 瓶 4 A	div / 15min		●						
2 ブドウ糖注 5% ( 100mL )	1 瓶	div / 15min		●						
3 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) ドキシル注	1 瓶 _____ mg [ 30mg/m <sup>2</sup> ]	div / 1.5hr		○						
4 ブドウ糖注 5% ( 100mL )	1 瓶	div / 30min		●						
5 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / 15min		●						
6 生食注 ( 100mL ) アバチン点滴用	1 瓶 _____ mg [ 15mg/kg ]	div / ※ 1.5hr		○						
7 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / 15min		●						

※ドキシル単剤療法1コース施行後、2コース目から併用療法。

※アバチン注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr), 2回目(1hr), 3回目以降(30min)で投与可。

※皮膚障害対策として、あらかじめ”手足症候群対応セット”をオーダーしてください。