

## 23N019\_(婦)CBDCA + GEM + AVASTIN

CBDCA ( Day 1 ) + GEM ( Day 1・8 ) + Bevacizumab ( Day 1 ) 3週毎 6コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(Day1)から\_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレピタントCap	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	po		●	●	●				
2 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(フラッシュ)		●						
3 生食注 ( 100mL ) アバスタチン点滴用	1 瓶 _____ mg [ 15mg/kg ]	div / ※ 1.5hr		○						
4 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(フラッシュ)		●						
5 グラニセトロン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1. 65mg	1 袋 3 A	div / 15min		●						
6 生食注 ( 50mL ) デカドロン注射液1. 65mg	1 瓶 4 A	div / 15min								● Day 8
7 生食注 ( 100mL ) ゲムシタピン注	1 瓶 _____ mg [ 1000mg/m <sup>2</sup> ]	div / 30min		○						○ Day 8
8 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(フラッシュ)		●						
9 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [ AUC 4 ]	div / 1hr		○						
10 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div(フラッシュ)		●						● Day 8

※アバスタチン注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。