

27N003_頭頸部_ERBITUX + CBDCA + FU 3週毎

Cetuximab (Day 1・8・15) + CBDCA (Day 1) + FU (Day 1-4) 3週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____ コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレピタントCap	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	po		●	●	●				
11 生食注 (100mL) デカドロン注射液1. 65mg ボララミン注5mg	1 瓶 6 A 1 A	div / 15min		●						
										● Day 8 / Day 15
12 生食注 (50mL)	1 瓶	div / 15min		●						
										● Day 8 / Day 15
13 生食注 (250mL) アービタックス注射液	※ _____ mg [初回 400mg/m ²] _____ mg [2回目以降 250mg/m ²]	div / 初回 2hr 2回目以降 1hr		○						
										○ Day 8 / Day 15
14 生食注 (50mL)	1 瓶	div / ※1hr 経過観察		●						
										● Day 8 / Day 15
※初回は1時間。以後、医師の判断で30分に短縮可。										
15 グラニセトロン点滴3mgバッグ	1 袋	div / 30min		●						
16 ブドウ糖注 5% (250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [AUC 5]	div / 1hr		○						
17 生食注 (1リットル) 5-FU注	1 袋 _____ mg [1000mg/m ²]	div / 24hr		○	○	○	○			

※ 皮膚障害対策として、あらかじめ”RASH対応セット”をオーダーしてください。