

## 27N004\_頭頸部\_ERBITUX + CDDP + FU 3週毎

Cetuximab ( Day 1・8・15 ) + CDDP ( Day 1 ) + FU ( Day 1-4 ) 3週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_ コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アプレピタントCap	125mg (Day1) 80mg (Day2-3)	po		●	●	●				
2 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po			●	●	●			
11 テルモ生食 (500mL) 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1 袋 8 mEq	div / 2hr		●						
12 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●						
13 生食注 (100mL) デカドロン注射液1.65mg ボラミン注5mg	1 瓶 6 A 1 A	div / 15min		●						
14 生食注 (50mL)	1 瓶	div / 15min		●						
15 生食注 (250mL) アービタックス注射液	※ _____ mg [ 初回 400mg/m <sup>2</sup> ]  _____ mg [ 2回目以降 250mg/m <sup>2</sup> ]	div / 初回 2hr 2回目以降 1hr		○						
16 生食注 (50mL)	1 瓶	div / ※1hr 経過観察		●						
※初回は1時間。以後、医師の判断で30分に短縮可。										
17 生食注 (1リットル) 5-FU注	1 袋 _____ mg [ 1000mg/m <sup>2</sup> ]	div / 24hr		○	○	○	○			
18 アロキシ点滴注バッグ0.75mg	1 袋	div (側管) / 30min		●						
19 テルモ生食 (500mL) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [ 80mg/m <sup>2</sup> ]	div (側管) / 2hr		○						
20 20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div (側管) / 1hr		●						
21 ソリューゲンF注 (500mL)	1 袋	div (側管) / 5hr		●						
				×2						

※ 皮膚障害対策として、あらかじめ”RASH対応セット”をオーダーしてください。