

## 27N008\_頭頸部\_ERBITUX + PTX + CBDCA 3週毎

Cetuximab ( Day 1・8・15 ) + PTX ( Day 1・8 ) + CBDCA ( Day 1・8 ) 3週毎 6コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(Day1)から\_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

◆ アルコールに対する過敏症はありませんか? → ( 有 , 無 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アブレヒタントCap	125mg(Day1, 8) 80mg(Day2-3, 9-10)	po		●	●	●				
						● Day 8-10				
2 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po			●	●	●			
						● Day 9-11				
11 生食注 ( 100mL ) デカドロン注射液1.65mg ボラミン注5mg	1 瓶 5 A 1 A	div / 15min		●						
						● Day 8 / Day 15				
12 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / 15min		●						
						● Day 8 / Day 15				
13 生食注 ( 250mL ) アービタックス注射液	※ _____ mg [ 初回 400mg/m <sup>2</sup> ]  _____ mg [ 2回目以降 250mg/m <sup>2</sup> ]	div / 初回 2hr 2回目以降 1hr		○						
						○ Day 8 / Day 15				
14 生食注 ( 100mL ) ガスター注射液20mg	1 瓶 1 A	div / ※1hr		●						
						● Day 8 / -----				
						※初回は1時間。以後、医師の判断で30分に短縮可。				
15 生食注 ( 250mL ) パクリタキセル注	1 袋 _____ mg [ 100mg/m <sup>2</sup> ]	div / 1hr		○						
						○ Day 8 / -----				
16 グラニセトロン点滴3mgバッグ	1 袋	div / 15min		●						
						● Day 8 / -----				
17 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [ AUC 2.5 ]	div / 1hr		○						
						○ Day 8 / -----				
18 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ Day15は30min		●						
						● Day 8 / Day 15				

※ 皮膚障害対策として、あらかじめ”RASH対応セット”をオーダーしてください。

※ パクリタキセル注投与時には、0.22ミクロン以下のメンブレンフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。  
また、点滴用セット等で溶解液が接触する部分に、可塑剤としてDEHPを含有しているものの使用を避けること。