

## 42N001\_CHOP ( 一般 )

CPA ( Day 1 ) + DXR ( Day 1 ) + VCR ( Day 1 ) + Prednisolone ( Day 1 - 5 ) 3週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_ コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです!!

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 グラニセトロン点滴3mgバッグ	1 袋	div / 30min		●						
2 生食注 ( 50mL ) オンコピン注射用	1 瓶 _____ mg [ 1.4mg/m <sup>2</sup> ] ※ Max 2.0mg/body	div / 15min		○						
3 生食注 ( 100mL ) ドキシソルピシン塩酸塩注	1 瓶 _____ mg [ 50mg/m <sup>2</sup> ]	div / 30min		○						
4 ソルデム3A ( 500mL ) 注射用エンドキサシ	1 袋 _____ mg [ 750mg/m <sup>2</sup> ]	div / 3hr		○						
5 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
6 プレドニゾロン錠	_____ mg [ 100mg/body ]	po		●	●	●	●	●		

- 必要時、グラニセトロンバッグにデカドロン注を追加。
- hydration処方が必要な時、別オーダーとする。
- 1回目に嘔気が強かった人のみ、2回目からイメンドCapを追加。