

## 42N014\_R-THP-COP ( ML1 )

Rituximab ( Day 1 ) + CPA ( Day 3 ) + THP ( Day 3 ) + VCR ( Day 3 ) + Prednisolone ( Day 3 - 7 ) 3週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_ コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

◇ ML1 : PS 0~3 かつ、Alb 3.0g/dL 以上

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 カロナール錠 200mg	3 Tab	po / リツキシマブ投与30分前		●						
2 生食注 ( 100mL ) ボララミン注5mg	1 瓶 1 A	div / 30min		●						
3 テルモ生食 ( 500mL ) リツキシマブBS点滴静注	1 袋 _____ mg [ 375mg/m2 ]	div / 25→100mL/hへ		○						
4 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
5 グラニセトロン点滴3mgバッグ	1 袋	div / 30min				●				
6 生食注 ( 50mL ) オンコピン注射用	1 瓶 _____ mg [ 1mg/m2 ] ※ Max 2.0mg/body	div / 15min				○				
7 ブドウ糖注 5% ( 100mL ) テラルピシン注射用	1 瓶 _____ mg [ 70~79歳 40mg/m2 ] [ 80歳以上 30mg/m2 ]	div / 30min				○				
8 ソルデム3A ( 500mL ) 注射用エンドキサン	1 袋 _____ mg [ 70~79歳 650mg/m2 ] [ 80歳以上 400mg/m2 ]	div / 3hr				○				
9 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ				●				
10 プレドニゾン錠	_____ mg [ 70~79歳 40mg/m2 ] [ 80歳以上 30mg/m2 ]	po				●	●	●	●	●

- 必要時、グラニセトロンバッグにデカドロン注を追加。
- hydration処方は必要時、別オーダーとする。