

42N017_CHASE

VP-16 (Day 1 - 3) + CPA (Day 1) + Ara-C (Day 2・3) + Dexamethasone (Day 1 - 3) 3週毎 3-6コース

◆ _____月_____日 (Day1) から _____ コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
11 アロキシン点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液	1 袋 40mg (デキサメタゾンとして)	IVH サブ' / 1hr		●						
12 生食注 (100mL) デカドロン注射液	1 瓶 40mg (デキサメタゾンとして)	IVH サブ' / 1hr			●	●				
13 テルモ生食 (500mL) エトボシド点滴静注液	1 袋 _____ mg [100mg/m2]	IVH サブ' / 2hr		○	○	○				
14 ソルデム3A (500mL) 注射用エンドキサン	1 袋 _____ mg [1200mg/m2]	IVH サブ' / 2hr		○						
15 ソルデム3A (500mL) シタラビン注	※ _____ mg [2g/m2] (※全量 500mL とする。)	IVH サブ' / 3hr			○	○				
16 ソルデム3A (500mL) メイロン静注8.4% (20mL) フロセミド注射液20mg	1 袋 2 A 0.5-1 A	IVH サブ' / 2.5hr		●	●	●				
17 ソルデム3A (500mL) メイロン静注8.4% (20mL)	1 袋 2 A	IVH サブ' / 2.5hr		●	●	●				
18 ソルデム3A (500mL)	1 袋	IVH サブ' / 翌朝まで		●	●	●				
21 YDソリター-T1号 (500mL)	1 袋	IVH メイン / 24hr		●	●	●				
22 生食注 (50mL) ウロミテキサン注	1 瓶 _____ mg [480mg/m2/回]	IVH メイン / 30min ★3回/日★		●						

エンドキサン注の投与開始時, 4hr後, 8hr後

- G-CSFを併用。
- シタラビン注の投与時はフルメロン点眼液を使用。(投与直前, 2hr後, 4hr後)
- エトボシド注の投与時は, DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット, カテーテル等の使用を避けること。