

42N031_R-Bendamustine

Rituximab (Day 1) + Bendamustine (Day 2・3) 4週毎 6コース

◆ _____月_____日 (Day1) から _____ コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 カロナール錠 200mg	3 Tab	po		●						
2 生食注 (100mL) ボラミン注5mg	1 瓶 1 A	div / 30min		●						
3 テルモ生食 (500mL) リツキシマブBS点滴静注	1 袋 _____ mg [375mg/m ²]	div / ※ 25→ 50→100mL/hr		○						
11 アロキシン点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液1. 65mg	1 袋 4A	div / 30min			●					
12 生食注 (100mL) デカドロン注射液1. 65mg	1 瓶 4A	div / 30min					●			
13 生食注 (250mL) トレアキシシン点滴静注	※ _____ mg [90mg/m ²] (全量 250mL とする。)	div / 1hr				○	○			
14 ソルデム3A (500mL) メイロン静注8.4% (20mL) フロセミド注射液20mg	1 袋 2 A 1 A	div / 2.5hr			●	●				
15 ソルデム3A (500mL) メイロン静注8.4% (20mL)	1 袋 2 A	div / 2.5hr			●	●				

※ リツキシマブBS注は初回投与時の副作用が軽微であった場合、2回目以降は100mL/hrからの開始でも可。

※ トレアキシシン注は調製後3時間以内に投与終了すること。