

## 42N041\_ABVD

VLB ( Day 1・15 ) + DXR ( Day 1・15 ) + BLM ( Day 1・15 ) + DTIC ( Day 1・15 ) + Hydrocortisone ( Day 1・15 ) 4週毎 6-8コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アロキシン点滴注バッグ0.75mg ソル・コーテフ注射用	1 袋 100mg	div / 30min		●					● Day 15	
2 生食注 ( 50mL ) エクザール注射用	1 瓶 _____ mg [ 6mg/m <sup>2</sup> ]	div / 15min		○					○ Day 15	
3 生食注 ( 100mL ) トキシソルピシン塩酸塩注	1 瓶 _____ mg [ 25mg/m <sup>2</sup> ]	div / 30min		○					○ Day 15	
4 生食注 ( 50mL ) ブレオ注射用	1 瓶 _____ mg [ 9mg/m <sup>2</sup> ] ※ Max 15mg/body	div / 15min		○					○ Day 15	
5 テルモ生食 ( 500mL ) ダカルバジン注用	1 袋 _____ mg [ 250-350mg/m <sup>2</sup> ]	div / 2hr		○					○ Day 15	
6 ソルデム3A ( 500mL ) メイロン静注8.4% ( 20mL ) フロセミド注射液20mg	1 袋 2 A 0.5-1 A	div / 2.5hr		●					● Day 15	
7 ソルデム3A ( 500mL ) メイロン静注8.4% ( 20mL )	1 袋 2 A	div / 2.5hr		●					● Day 15	

- ・ブレオ注の総投与量上限は300mg/bodyとする。
- ・ダカルバジン注はルートを含め遮光すること。(血管痛防止のため。)
- ・Rp6およびRp7のhydration処方については省略することがある。
- ・1回目に嘔気が強かった人のみ、2回目からイメンドCapを追加。