

## 42N204\_HD-AraC + MIT ( 50才以下 ) [ 地固め療法 ]

Ara-C ( Day 1・3・5 ) + MIT ( Day 6 ) 3コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_ コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです！！

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
11 アロキシ点滴注バッグ0.75mg ソル・コーテフ注射用	1 袋 100mg	IVH サブ(青) / 30min		●				●		
12 生食注 ( 100mL ) ソル・コーテフ注射用	1 袋 100mg	IVH サブ(青) / 30min ★1~2回/日★		●		●		●	●	
13 ソルデム3A ( 500mL ) シタラビン注	※ _____ mg [ 3g/m2/回 ] ( ※全量 500mL とする。 )	IVH サブ(青) / 2hr		○ ×2		○ ×2		○ ×2		
14 ソルデム3A ( 500mL ) メイロン静注8.4% ( 20mL ) フロセド注射液20mg	1 袋 2 A 0.5-1 A	IVH サブ(青) / 2.5hr ★1~2回/日★		●		●		●	●	
15 生食注 ( 100mL ) ノバントロン注	1 瓶 _____ mg [ 10mg/m2 ]	IVH サブ(青) / 30min								○
21 YDソリター-T1号 (500mL) メイロン静注8.4% ( 20mL )	1 袋 1 A	IVH メイン(白) / 12hr ★2回/日★		●	●	●	●	●	●	●

・シタラビン注の投与時はフルメトロン点眼液を使用。