

42N205_HD-AraC + MIT (50-70才) [地固め療法]

Ara-C (Day 1 - 5) + MIT (Day 1・2) 3コース

◆ _____月_____日 (Day1) から _____ コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

★ (注意喚起) 累積投与量に注意が必要なレジメンです!!

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
11 アロキシ点滴注バッグ0.75mg ソル・コーテブ注射用	1 袋 100mg	IVH サブ(青) / 30min		●				●		
12 生食注 (100mL) ソル・コーテブ注射用	1 瓶 100mg	IVH サブ(青) / 30min			●	●	●			
13 生食注 (100mL) ノバントロン注	1 瓶 _____ mg [8mg/m ²]	IVH サブ(青) / 30min		○	○					
14 ソルデム3A (500mL) シタラビン注	※ _____ mg [2g/m ²] (※全量 500mL とする。)	IVH サブ(青) / 4hr		○	○	○	○	○		
15 ソルデム3A (500mL) メイロン静注8.4% (20mL) フロセミド注射液20mg	1 袋 2 A 0.5-1 A	IVH サブ(青) / 2.5hr		●	●	●	●	●		
21 YDソリター-T1号 (500mL) メイロン静注8.4% (20mL)	1 袋 1 A	IVH メイン(白) / 12hr ★2回/日★		●	●	●	●	●		

- 60-70才では, Ara.Cは最大50%減量可。
- シタラビン注の投与時はフルメトロン点眼液を使用。