

42N351_HyperCVAD (course A)

CPA(Day1-3) + MTX/Ara-C/PSL(Day2) + VCR(Day4・11) + DXR(Day4) + Dexamethasone(Day1-4/Day11-14) AB交互に4コース

◆ _____月_____日(Day1)から_____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

★(注意喚起)累積投与量に注意が必要なレジメンです!!

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 アロキシ点滴注バッグ0.75mg デカドロン注射液	1 袋 40mg (デキサメタゾンとして)	div / 1hr		●						
2 生食注 (100mL) デカドロン注射液	1 瓶 40mg (デキサメタゾンとして)	div / 1hr			●	●	●			
3 ソルデム3A (500mL) 注射用エンドキササン	1 袋 _____ mg [300mg/m2/回]	div / 2hr		○ ×2	○ ×2	○ ×2				
4 ソルデム3A (500mL) メイロン静注8.4% (20mL) フロセミド注射液20mg	1 袋 2 A 0.5-1 A	div / 2.5hr ★2回/日★		●	●	●				
5 生食注 (50mL) オンコピン注射用	1 瓶 _____ mg [2mg/body]	div / 15min								○
6 生食注 (100mL) ドキシソルピシン塩酸塩注	1 瓶 _____ mg [50mg/m2]	div / 30min								○
7 生食注 (100mL) デカドロン注射液	1 瓶 40mg (デキサメタゾンとして)	div / 1hr								● Day 11 - 14
8 注用メソトレキセート シタラピン注 水溶性プレドニン注	_____ mg [15mg/body] _____ mg [40mg/body] _____ mg [20mg/body]	IT					○			

- G-CSFを併用。
- バクタ/アゾール系抗菌薬を予防内服。
- 1回目に嘔気が強かった人のみ、2回目からイメンDcapを追加。