











アフリベルセプトベータ+FOLFIRI療法

【治療スケジュール】

以下のメニューのおくすりを2週間毎繰り返します。

← 1クール →

	薬剤名	外観	液色	薬効	投与方法	第1日目	2日	3日	4~14日
①	ヘパリンシリンジ		無色	ルートの通りを確認します。	↓ 導通確認				
②	生食注		無色	お薬を洗い流します。	↓ 全開・点滴				
③	ザルトラップ注 [®] (アフリベルセプトβ)		無色	細胞増殖を抑えます。	↓ 60分・点滴				
④	生食注		無色	お薬を洗い流します。	↓ 全開・点滴				
⑤	グラニセトンバッグ デカドロン注		無色	むかつき、吐き気及びお薬の過敏症を抑えます。	↓ 15分・点滴				
⑥	レボホリナート注		無色	お薬の効果を高めます。	↓ 2時間・点滴				
	イリノテカン注 [®] (イリノテカン)		無色	細胞増殖を抑えます。	↓ 90分・側管点滴				
⑦	5-FU注 [®] (フルオロウラシル)		無色	細胞増殖を抑えます。	↓ 全開・点滴				
⑧	5-FU注 [®] (フルオロウラシル)		無色	細胞増殖を抑えます。	↓ 46時間持続ポンプ				
⑨	ヘパリンシリンジ		無色	ルートの通りを確認します。	導通確認		お休み	↓	

お休み
お休み
お休み

※お薬の投与速度・投与間隔が変わることがあります。
 ※また、症状に応じてお薬を変更・追加・削除することがあります。


【注意事項】

点滴中は安静にし、注射の針を刺している部分が動かないように心掛けてください。お薬が皮膚に漏れると、針を刺している部分に違和感や痛み、腫れ、赤み等が現れることがあります。このような症状がありましたら速やかにお知らせください。また、このような症状は点滴終了後や、しばらくたってから起こることがありますのでご注意ください。

血圧が高くなることもあるので、自宅でも家庭用血圧計を用いて、定期的に血圧をチェックしましょう。

【副作用と発現時期】

ここにはあくまで一般的に予想される副作用が、いつごろ現れるかをお示ししています。
これらの症状が必ず起こるということではありません。発現頻度・程度・時期には個人差があります。
また、これら以外の副作用が現れることもありますので、症状が現れた時はお知らせください。



【注意が必要な副作用】

次に示すような副作用が報告されています。下記の症状が現れた時は医師または薬剤師へお知らせください。

- 骨髄抑制 : ★38℃以上の発熱、咳、下痢、排尿痛・残尿感、性器痛、肛門痛、
鼻血、血便・血尿、歯茎出血、腕や足の赤い斑点、疲れやすい、めまい・息切れ
- 過敏症 : ★呼吸困難、じん麻疹、眼および口の周囲の腫れ、冷汗、頻脈
- 消化器症状 : ★突然の激しい腹痛、背部痛、重度の下痢、脱水症状、もたれ、胸やけ、吐き気、嘔吐、食欲不振
- 心障害 : ★呼吸困難、足などのむくみ、咳の増加、胸痛、みぞおちや頸部の締付け、圧迫感、冷汗
- 腎障害 : ★顔・手足などのむくみ、尿量減少、尿が赤みを帯びる、体重減少、口の渇き、高度の蛋白尿
- 肝障害 : ★全身倦怠感、食欲不振、疲れやすい、腹部不快感、黄疸(皮膚や眼などが黄色くなる)
- 脳障害 : ★突然の激しい頭痛、意識障害、歩行時のふらつき、四肢末端のしびれ感、舌のもつれ、
うまく話せない、けいれん発作、精神状態変化、視覚異常
- 肺障害 : ★胸痛、意識障害、呼吸困難、(空)咳、発汗、発熱、ピンク色の痰がでる、尿量減少、むくみ
- 手足症候群 : ★手のひらや足の裏がぴりぴりする、指先の感覚異常、皮膚や爪の変色
- 血栓 : ★意識を失いそうになる、身体の麻痺、ろれつがまわらない、激しいめまい、
胸が痛む・締付けられる感じ、足がむくむ・痛む、突然の息切れ
- 高血圧 : ★我慢できない頭痛、気分が悪く吐き気がする、意識がもうろうとする、けいれん
- 下痢・脱水 : ★口の渇き、手足のふるえ、過呼吸、重度の下痢、意識障害(時に昏睡)
- 臭覚障害 : ★臭いが感じにくくなる
- 創傷治癒遅延 : ★傷口が治りにくい、傷口がひらく、傷口からの出血
- 出血 : ★口から血を吐く、血便、鼻血や歯肉、膣からの出血

連絡先 大津赤十字病院
Tel 077-522-4131

平日8:30 ~ 17:00 受診されている診療科
平日17:00 ~ 翌8:30 及び 休日 救急外来