





テモゾロミド+ベバシズマブ療法（維持）

2021/7/27 18N002

＋ 大津赤十字病院 薬剤部

【治療スケジュール】

以下のメニューのおくすりを4週間毎繰り返します。

| | | | | ← 1クール → | | | |
|------------------------------------|---|----|------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|
| 薬剤名 | 外観 | 液色 | 薬効 | 第1日目 投与方法 | 2～14日 点滴 | 15日 点滴 | 16～28日 点滴 |
| ① 生食注 |  | 無色 | お薬を洗い流します。 | ↓ 全開・点滴 | お休み | ↓ | お休み |
| ② アバスチン注 [®] (ベバシズマブ) |  | 無色 | 細胞増殖を抑えます。 | ↓ 30～90分・点滴 | | ↓ | |
| ③ 生食注 |  | 無色 | お薬を洗い流します。 | ↓ 全開・点滴 | | ↓ | |
| テモダールカプセル [®] (テモゾロミド) |  | | 細胞増殖を抑えます。 | 1日1回 5日間・空腹時に内服 | 23日間お休み | | |


※お薬の投与速度・投与間隔が変わることがあります。
 ※また、症状に応じてお薬を変更・追加・削除することがあります。

【注意事項】

点滴中は安静にし、注射の針を刺している部分が動かないように心掛けてください。
 お薬が皮膚に漏れると、針を刺している部分に違和感や痛み、腫れ、赤み等が現れることがあります。
 このような症状がありましたら速やかにお知らせください。
 また、このような症状は点滴終了後や、しばらくたってから起こることがありますのでご注意ください。
 血圧が高くなることもあるので、自宅でも家庭用血圧計を用いて、定期的に血圧をチェックしましょう。

【副作用と発現時期】

ここにはあくまで一般的に予想される副作用が、いつごろ現れるかをお示ししています。これらの症状が必ず起こるということではありません。発現頻度・程度・時期には個人差があります。また、これら以外の副作用が現れることもありますので、症状が現れた時はお知らせください。



※骨髄は、血液成分である白血球・赤血球・血小板等を産生する臓器です。骨髄抑制とは、その機能が低下することを言います。

【注意が必要な副作用】

頻度は高くありませんが、次に示すような副作用が報告されています。下記の症状が現れた時は医師または薬剤師へお知らせください。

- 骨髄抑制 : ★38℃以上の発熱、咳、下痢、排尿痛・残尿感、性器痛、肛門痛、鼻血、血便・血尿、歯茎出血、腕や足の赤い斑点、疲れやすい、めまい・息切れ
- 過敏症 : ★呼吸困難、じん麻疹、眼および口の周囲の腫れ、冷汗、頻脈
- 消化器症状 : ★突然の激しい腹痛、背部痛、重度の下痢、脱水症状、もたれ、胸やけ、吐き気、嘔吐、食欲不振
- 心障害 : ★呼吸困難、足などのむくみ、咳の増加、胸痛、みぞおちや頸部の締付け、圧迫感、冷汗
- 腎障害 : ★顔・手足などのむくみ、尿量減少、尿が赤みを帯びる、体重減少、口の渇き、高度の蛋白尿
- 肝障害 : ★全身倦怠感、食欲不振、疲れやすい、腹部不快感、黄疸(皮膚や眼などが黄色くなる)
- 脳障害 : ★突然の激しい頭痛、意識障害、歩行時のふらつき、四肢末端のしびれ感、舌のもつれ、うまく話せない、けいれん発作、精神状態変化、視覚異常
- 皮膚障害 : ★中央に浮腫を伴った発疹、まぶた・眼球結膜の充血、口腔内の痛みを伴った粘膜疹
- 肺障害 : ★胸痛、意識障害、呼吸困難、(空)咳、発汗、発熱、ピンク色の痰がでる、尿量減少、むくみ
- 血栓 : ★意識を失いそうになる、身体の麻痺、ろれつがまわらなくなる、激しいめまい、胸が痛んだり締め付けられるような感じ、足がむくんだり痛みが出る、突然の息切れ
- 高血圧 : ★我慢できない頭痛、気分が悪く吐き気がする、意識がもうろうとする、けいれん
- 出血 : ★口から血を吐く、血便、鼻血や歯肉、膣からの出血
- 創傷治癒遅延 : ★傷口が治りにくい、傷口がひろく、傷口からの出血

連絡先 大津赤十字病院

TEL 077-522-4131

平日8:30 ~ 17:00 受診されている診療科

平日17:00 ~ 翌8:30 及び 休日 救急外来