

00N001_キイトルーダ【6週毎】

Pembrolizumab (Day 1) 6週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____ コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

◆ 免疫チェックポイント阻害薬カンファレンス前検査はすべて実施しましたか? → (はい ・ いいえ)

◆ 検査が実施されない場合、がん化学療法の実施は認められません。

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 生食注 (50mL)	1 瓶	div / 15min		●						
2 生食注 (100mL) キイトルーダ点滴静注	1 瓶 400 mg [400mg/body]	div / 30min		○						
3 生食注 (50mL)	1 瓶	div / 15min		●						

① 本剤の投与にあたっては、インラインフィルター(0.2~0.22 μ m)を使用すること。

② 希釈後の濃度は、1~10mg/mLとなること。

■悪性黒色腫

通常、成人には、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。ただし、術後補助療法の場合は、投与期間は12ヵ月間までとする。

■根治切除不能又は転移性の腎細胞癌

アキシチニブとの併用において、通常、成人には、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)として、1回200mgを3週間間隔又は1回400mgを6週間間隔で30分間かけて点滴静注する。