

05G009_CBDCA(1) + VP-16(1・2・3) 3週毎

CBDCA (Day 1) + VP-16 (Day 1・2・3) 3週毎

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 グラニセトロン点滴3mgパッケ アロカリス点滴静注 235mg デカドロン注射液1. 65mg	1 袋 1 瓶 3 A	div / 30min		●						
2 生食注 (50mL)	1 瓶	div(フラッシュ) / 全開		●						
3 生食注 (100mL) デカドロン注射液1. 65mg	1 瓶 3 A	div / 15min			●	●				
4 ブドウ糖注 5% (250mL) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [AUC 5]	div / 1hr		○						
5 生食注 (50mL)	1 瓶	div(フラッシュ) / 全開		●	●	●				
6 テルモ生食 (500mL) ペプシド注	1 袋 _____ mg [100mg/m2]	div / 1.5hr		○	○	○				
7 生食注 (50mL)	1 瓶	div(フラッシュ) / 全開		●	●	●				

・ペプシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。