

05N012\_AVASTIN(1)+CBDCA(1)+<sup>o</sup>ペメトレ(1) 3週毎

Bevacizumab ( Day 1 ) + CBDCA ( Day 1 ) + Pemetrexed ( Day 1 ) 3週毎 6コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日(Day1)から\_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 プレスミンS注射液1000 $\mu$ g	1 A	im								
										● Day -6 より9週毎に投与。
2 調剤用バンピタン末	1g	po / 分1								
										● Day -6 より連日投与。
3 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po	●	●	●					
4 グラニセトロン点滴3mg <sup>o</sup> バッグ アロカリス点滴静注 235mg	1 袋 1 瓶	div / 30min		●						
5 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
6 生食注 ペメトレキセド点滴静注液	※ _____ mg [ 500mg/m <sup>2</sup> ] ( 全量 100mL とする。 )	div / 10min		○						
7 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / 30min		●						
8 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) カルボプラチン注	1 袋 _____ mg [ AUC 6 ]	div / 1hr		○						
9 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
10 生食注 ( 100mL ) アバスチン点滴用	1 瓶 _____ mg [ 15mg/kg ]	div / ※ 1.5hr		○						
11 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						

※アバスチン注は忍容性良好であれば、初回(1.5hr)、2回目(1hr)、3回目以降(30min)で投与可。

・NSAIDsは5日間中止を考慮。( Day -1 ~ 3 )

・大量胸水、腹水貯留例は排除後に投与すること。