

05N013_Short CDDP(1) + VP-16(1・2・3) 3週毎

CDDP (Day 1) + VP-16 (Day 1・2・3) 3週毎 6コース

◆ _____月_____日 (Day1) から _____コース実施。 (外来で実施 ・ 入院で実施)

Rp. 商品名	用量 [基準量]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po			●	●	●			
2 バロノセロン注ハック0.75mg/50mL アロカリス点滴静注 235mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 1 瓶 6 A	div / 30min		●						
3 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●	●				
4 テルモ生食 (500mL) ペプシド注	1 袋 _____ mg [100mg/m ²]	div / 1.5hr		○	○	○				
5 生食注 (50mL)	1 瓶	div / フラッシュ		●	●	●				
6 YDソリターT1号 (500mL) アスバラギン酸カリウム注10mEqキット 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1 袋 1 キット 8 mEq	div / 1hr		●						
7 20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div / 30min		●						
8 生食注 (250mL) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [80mg/m ²]	div / 1hr		○						
9 ソルデム3A (500mL)	1 袋	div / 1hr		●						

- ・ペプシド注の投与時は、DEHPを含むポリ塩化ビニル製の点滴セット、カテーテル等の使用を避けること。
- ・Day1～3:水分摂取1L。(1日目はシスプラチンの投与が終了するまでに水分1Lを摂取すること。)
- ・脱水、食思不振時は追加補液。