

## 05N014\_Short CDDP(1) + CPT-11(1・8・15) 4週毎

CDDP ( Day 1 ) + CPT-11 ( Day 1・8・15 ) 4週毎 6コース

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 (Day1) から \_\_\_\_\_コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 デカドロン錠 0.5mg	16 Tab	po			●	●	●			
● Day 9-10 / Day 16-17										
2 パロセトン注ハッグ0.75mg/50mL アロカリス点滴静注 235mg デカドロン注射液1.65mg	1 袋 1 瓶 6 A	div / 30min		●						
3 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
4 グラニセトン点滴3mgハッグ デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	div / 15min								
● Day 8 / Day 15										
5 テルモ生食 ( 500mL ) イリノテカン塩酸塩注	1 袋 _____ mg [ 60mg/m <sup>2</sup> ]	div / 1.5hr		○						
○ Day 8 / Day 15										
6 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ		●						
7 YDソリターT1号 ( 500mL ) アスバラギン酸カルウム注10mEqキット 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1 袋 1 キット 8 mEq	div / 1hr		●						
8 20%マンニトール注(300mL)	1 袋	div / 30min		●						
9 生食注 ( 250mL ) シスプラチン注	1 袋 _____ mg [ 60mg/m <sup>2</sup> ]	div / 1hr		○						
10 ソルデム3A ( 500mL )	1 袋	div / 1hr		●						
11 生食注 ( 50mL )	1 瓶	div / フラッシュ								
● Day 8 / Day 15										

- Day1～3:水分摂取1L。(1日目はシスプラチンの投与が終了するまでに水分1Lを摂取すること。)
- 脱水、食思不振時は追加補液。