

## 10N002\_大腸\_mFOLFOX 6 ( リザーバー )

I-LV ( Day 1 ) + FU ( Day 1 ) + L-OHP ( Day 1 ) 2週毎

◆ \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 ( Day 1 ) から \_\_\_\_\_ コース実施。 ( 外来で実施 ・ 入院で実施 )

Rp. 商品名	用量 [ 基準量 ]	投与方法	Day 0	1	2	3	4	5	6	7
1 ヘパリンNaロック100u/mLシリンジ	1 筒	導通確認		●						
2 グラニセトロン点滴3mgバッグ デカドロン注射液1.65mg	1 袋 6 A	メイン / 30min		●						
3 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) オキサリプラチン点滴静注液	1 袋 _____ mg [ 85mg/m <sup>2</sup> ]	メイン / 2hr I-LVと同時		○						
4 ブドウ糖注 5% ( 250mL ) レボホリナート注	1 袋 _____ mg [ I-LV 200mg/m <sup>2</sup> ]	側管 / 2hr L-OHPと同時		●						
5 生食注 ( 50mL ) 5-FU注	1 瓶 _____ mg [ 400mg/m <sup>2</sup> ]	メイン / 全開		○						
6 生食注 5-FU注	※ _____ mg [ 2400-3000mg/m <sup>2</sup> ]	メイン / 46hr		○						
7 ヘパリンNaロック100u/mLシリンジ	1 筒	ヘパロック					●			

※ 5-FU注のリザーバー全量は薬剤部規定の希釈表に従うものとする。〈 注入時間:約46時間 〉